

MINUTA

SEÑORAS Y SEÑORES

MIEMBROS DEL CONCEJO

Por la presente minuta, me dirijo al plenario de solicitar se remita una nota al Ejecutivo Municipal y a la EBY peticionando la colocación de señalética vial vertical sobre las avenidas que colindan con grandes áreas silvestres o naturales, indicando el tipo de fauna que podría atravesar la calzada, además de carteles informativos en puntos frecuentemente visitados por aves migratorias.

El pedido obedece a la necesidad de proteger la fauna silvestre considerando varios casos de arrollamiento, además de visibilizar el potencial que tenemos como ciudad para el turismo vinculado a los atractivos naturales.

Se adjuntan, mapa de sectores para ubicación de carteles, imágenes referenciales sobre la señalética vial, además de las especies de aves que se pueden avistar en los sectores marcados.

Sin otro particular se solicita el tratamiento sobre tablas de la presente minuta y la remisión de una nota al Ejecutivo Municipal y a la Entidad Binacional Yacyretá.

Arq. Keiji Ishibashi

Secunda: Abog. Marino Fernández



Zona de avistamiento de aves



Zona de cruce de fauna





Jacana o Tuqui tuqui

La jacana común (*Jacana jacana*), también conocida como tuqui tuqui, gallareta o jacana suramericana,² es una especie de ave caradriforme de la familia Jacanidae habitual en los humedales de Sudamérica y Panamá. La hembra es más grande que el macho y forma harenes de hasta 4 y 5 machos.



Taguató

L: Macho: 33-37 cm. Hembra: 41 cm. Pico negro. Iris, cera y patas, amarillos. Cabeza y dorsalmente, pardo oscuro. Ventralmente blanquecino estriado longitudinalmente de canela en el pecho y barrado transversalmente con el mismo color en el abdomen. Alas cortas y anchas, pardo oscuras con manchas canelas en las primarias. Ventralmente tienen las cubiertas ocráceas finamente rayadas. Las secundarias y las primarias ocráceo claro con barras oscuras separadas y punta de las primarias oscuro.



Guira guira

El pirincho² (Guira guira) es una especie de ave cuculiforme de la familia de los cucúlidos que habita en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Es la única especie del género monotípico Guira.



Carancho

Caracara Plancus. Es un ave rapaz que mide entre 55 y 60 cm de largo. Presenta la parte superior de la cabeza negruzca, el resto de la misma y el cuello blanco grisáceo, y el dorso y pecho con líneas anchas pardas y blanco grisáceo. En vuelo se le observa una mancha alar clara y la cola blanquecina que termina con una banda negra. La piel de la cara es desnuda, rasgo típico de las aves carroñeras.



Garza Blanca

Mide entre 83–103 cm de longitud y pesa entre 0,7–1,2 kg, tiene todo el plumaje blanco. Su pico es amarillo en la época de reproducción y negro en otras épocas, y sus largas patas son de color rojo o negro. Los colores de las partes desnudas cambian durante la época de reproducción. El plumaje nupcial también se caracteriza por plumas largas en el cuello y un área facial verde.



Garza Chiflona

La garza chiflona,² garza silbadora, garza amarilla³ o garza chiflon⁴ (*Syrigma sibilatrix*) es una especie de ave pelecaniforme de la familia Ardeidae propia de América del Sur.⁵⁶ Es la única especie del género *Syrigma*. Vive en grupos o en parejas. Su reproducción es diferente a las de las demás garzas, ya que danzan y vuelan emitiendo un grito antes del apareamiento. Pone de 2 a 4 huevos. Mide entre 50 y 60 cm.



karãu

El carrao,2 caraú o guariao o karãu en guaraní (Aramus guarauna) es una especie de ave gruiformes, la única especie de la familia Aramidae, propia de zonas húmedas y pantanos.



Salvator marmoratus

El teju guasu, o lagarto overo, *Salvator marmoratus* (Duméril & Bibron, 1839), es un lagarto perteneciente a la familia Teiidae, que se distribuye por el centro y sur de Brasil, centro y norte de Argentina, centro y este del Paraguay, Uruguay y Bolivia. Único en el mundo capaz de calentar su sangre hasta 10 grados.



Hydrodynastes gigas

La ñakanina o ñacaniná (*Hydrodynastes gigas*) es una especie de serpiente sudamericana. Habita las zonas de pantanos, lagunas, bañados y arroyos de Argentina, Brasil, Bolivia, Guyana Francesa, Paraguay y Venezuela. *H. gigas* no tiene subespecies reconocidas.



Cavia aperea

El Apere`a (*Cavia aperea*) es una especie de roedor de la familia Caviidae, ampliamente distribuida por Sudamérica. Se halla en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.



Didelphis virginiana

Las zarigüeyas cumplen labores fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas. Se encargan de dispersar semillas en los bosques y controlar poblaciones de vertebrados más pequeños